



INGESILV

ASESORÍA TÉCNICA SILVOAGROPECUARIA


SAT CARNE REGIONAL

PROTOCOLOS VACUNACION DESPARASITACION

PROTOCOLO VACUNACIÓN



INGESILV
ASESORÍA TÉCNICA SILVOAGROPECUARIA



- Vacuna Manchal (ej: **Clostribac 9 P** :
 - 1° dosis a partir de los 3 meses de edad
 - Revacunación a los 21- 30 días
 - Revacunar cada 6 meses
 - Dosis último tercio gestación. Inmunidad calostrual

- Vacuna RB51 contra *Brucella abortus*:
 - 1° dosis a los 4-9 meses de edad
 - Dosis pre encaste

- Vacuna contra queratoconjuntivitis (Piliguard),
 - Vacunación antes primavera
 - repetir anual


- (DVB/Leptospirosis/IBR/PI3/VRSB)
 - Primovacunación: 2 dosis con intervalo de 4 semanas en animales mayores a 3 meses
 - Revacunar anual
 - Previo a encaste

- Vacuna Carbunco bacteridiano (Anthrax – Picada)
 - Anual
 - Primavera
 - Mayores 6 meses



INGESILV
ASESORÍA TÉCNICA SILVOAGROPECUARIA

PROTOCOLO DESPARASITACIÓN



- Parásitos Internos
- Gastrointestinales
- Animales jóvenes.

- Antiparasitario Externo
- Sarna, piojos mosca de los cuernos generan importantes pérdidas por estrés.
- Estrés disminuye inmunidad.

INDICADORES DE REPRODUCCION

- % de Preñez : 95%
 - Vaca Preñada/Vaca al encaste
- % Ternero Nacido Vivos: 97%
 - Ternero Nacido Vivo/Vaca Preñadas
- % de Destete: 98%
 - Terneros destetados/Ternero nacido vivo

INDICADORES DE PRODUCCION DE CARNE

- KG producidos /Há dedicada a rubro
- Kg de ternero destetados
- Kg de ternero destetados por vaca al encaste
- **Kg vendidos por Ha**

- Peso al Nacimiento
- Peso al Destete (madre e hijo)
- Peso al año